

At Home Instructions

Brush and floss teeth. Take a syringe out of the kit. Remove the cap and insert a dispensing tip by twisting it securely onto the syringe. Place a small drop of gel into every compartment of the tray for the teeth undergoing treatment.

Seat the tray with the gel around the teeth.

Wipe away any excess gel on the gums with your finger, a tissue or a dry soft tooth brush.

Depending on the level of staining on your teeth, and the health of your teeth, your dental professional would have supplied you with either 16%, 22%, 35% Carbamide Peroxide, 8%, or 14% Hydrogen Peroxide concentrations. This percentage will be marked on the syringe. Wear the trays in your mouth up to the recommended time frames as follows: 16% CP 30-60 minutes, 22% CP 30-45 minutes, 35% CP 5-15 minutes, 8% HP up to 30 minutes, and 14% HP up to 5 minutes.

After treatment, remove trays. Rinse tray and mouth with lukewarm water. Brush teeth. Repeat the procedure as required or instructed by your dental professional.

FDA, ISO & CE Certified Products
FDA, ISO & CET A Certifié Produits
FDA, ISO & CE Certificó Productos

Iveri Whitening
7-1900 Clark Blvd.
Brampton, ON, L6T 0E9
t. 1.416.231.9444
f. 1.866.257.9141
tf. 1.888.451.0555
www.iveriwhitening.com



iveri | ATHOME

Dentist Designed Teeth Whitening Solution

Solution pour Blanchir les Dents Créée par un Dentiste

Solución para Blanquear los Dientes Creado por un Dentista

At Home Instructions

Brush and floss teeth. Take a syringe out of the kit. Remove the cap and insert a dispensing tip by twisting it securely onto the syringe. Place a small drop of gel into every compartment of the tray for the teeth undergoing treatment.

Seat the tray with the gel around the teeth.

Wipe away any excess gel on the gums with your finger, a tissue or a dry soft tooth brush.

Depending on the level of staining on your teeth, and the health of your teeth, your dental professional would have supplied you with either 16%, 22%, 35% Carbamide Peroxide, 8%, or 14% Hydrogen Peroxide concentrations. This percentage will be marked on the syringe. Wear the trays in your mouth up to the recommended time frames as follows: 16% CP 30-60 minutes, 22% CP 30-45 minutes, 35% CP 5-15 minutes, 8% HP up to 30 minutes, and 14% HP up to 5 minutes.

After treatment, remove trays. Rinse tray and mouth with lukewarm water. Brush teeth. Repeat the procedure as required or instructed by your dental professional.

FDA, ISO & CE Certified Products
FDA, ISO & CET A Certifié Produits
FDA, ISO & CE Certificó Productos

Iveri Whitening
7-1900 Clark Blvd.
Brampton, ON, L6T 0E9
t. 1.416.231.9444
f. 1.866.257.9141
tf. 1.888.451.0555
www.iveriwhitening.com



iveri | ATHOME

Dentist Designed Teeth Whitening Solution

Solution pour Blanchir les Dents Créée par un Dentiste

Solución para Blanquear los Dientes Creado por un Dentista

Francais

Brosse et la soie dentaire des dents. Prenez une seringue dans le kit. Enlevez le capuchon et insérez un embout applicateur en tournant fermement sur la seringue.

Mettre une petite goutte de gel dans chaque compartiment du bac pour les dents qui suivent un traitement.

Accueillir le plateau contenant le gel sur vos dents.

Essuyer tout excès gel sur les gencives avec le doigt, un tissu ou une brosse à dents souple sec. Selon le niveau de formation de taches sur vos dents et la santé de vos dents, votre professionnel des soins dentaires serait ont fourni vous avec des concentrations de gel de peroxyde de Carbamide à 16%, 22%, 35% au 8%, 14% de peroxyde de Hydrogen. Ce pourcentage sera marqué sur la seringue. Porter les bacs dans votre bouche pour: 16% 30-60 minute, 22% 30-45 minute, 35% 5-15 minute, 8% jusqu'à 30 minute, 14% jusqu'à 5 minute. ou le temps recommandé par votre professionnel des soins dentaires.

Après le traitement, retirer le plateau. Rincez le plateau et la bouche avec de l'eau tiède.

Se brosser les dents. Répétez la procédure comme requis ou ayant reçu des directives de votre professionnel des soins dentaires.



Caution: Cosmetic use only. Not recommended if client is pregnant, nursing or under 14 years of age. Do not use if allergic to any of the ingredients. If contact with eyes occurs rinse immediately. Store in a cool place.

Précautions: Pour utilisation cosmétique seulement. Non recommandé pour les femmes enceintes, allaitantes et les personnes de moins de 14 ans. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des ingrédients. Dans ce cas, rincer l'œil affecté avec beaucoup d'eau froide. Entreposer dans un endroit frais.

Precaución: sólo el uso de cosméticos, no recomendó si cliente está embarazada, amamantando o con 14 años de edad. No utilizar si el alérgico a cualquiera de los ingredientes. Si se produce el contacto con los ojos lávese inmediata. Conservar en un lugar fresco.

Francais

Brosse et la soie dentaire des dents. Prenez une seringue dans le kit. Enlevez le capuchon et insérez un embout applicateur en tournant fermement sur la seringue.

Mettre une petite goutte de gel dans chaque compartiment du bac pour les dents qui suivent un traitement.

Accueillir le plateau contenant le gel sur vos dents.

Essuyer tout excès gel sur les gencives avec le doigt, un tissu ou une brosse à dents souple sec. Selon le niveau de formation de taches sur vos dents et la santé de vos dents, votre professionnel des soins dentaires serait ont fourni vous avec des concentrations de gel de peroxyde de Carbamide à 16%, 22%, 35% au 8%, 14% de peroxyde de Hydrogen. Ce pourcentage sera marqué sur la seringue. Porter les bacs dans votre bouche pour: 16% 30-60 minute, 22% 30-45 minute, 35% 5-15 minute, 8% jusqu'à 30 minute, 14% jusqu'à 5 minute. ou le temps recommandé par votre professionnel des soins dentaires.

Après le traitement, retirer le plateau. Rincez le plateau et la bouche avec de l'eau tiède.

Se brosser les dents. Répétez la procédure comme requis ou ayant reçu des directives de votre professionnel des soins dentaires.



Caution: Cosmetic use only. Not recommended if client is pregnant, nursing or under 14 years of age. Do not use if allergic to any of the ingredients. If contact with eyes occurs rinse immediately. Store in a cool place.

Précautions: Pour utilisation cosmétique seulement. Non recommandé pour les femmes enceintes, allaitantes et les personnes de moins de 14 ans. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des ingrédients. Dans ce cas, rincer l'œil affecté avec beaucoup d'eau froide. Entreposer dans un endroit frais.

Precaución: sólo el uso de cosméticos, no recomendó si cliente está embarazada, amamantando o con 14 años de edad. No utilizar si el alérgico a cualquiera de los ingredientes. Si se produce el contacto con los ojos lávese inmediata. Conservar en un lugar fresco.

Espanol

Cepillar y pasar hilo dental los dientes. Tomar una jeringa en el kit. Retire la tapa e introduzca una punta dispensadora girandola firmemente en la jeringuilla.

Colocar una pequena gota de gel en cada compartimiento de la bandeja para los dientes sometidos a tratamiento.

Coloque la cubeta con el gel alrededor de los dientes.

Limpie cualquier exceso de gel en las encias con el dedo, un pañuelo de papel o un cepillo de dientes suave seco.

Dependiendo del nivel de manchas en los dientes y la salud de sus dientes, su dentista habria suministrado con concentraciones de gel de peroxiso de carbamida al 16%, 22%, 35% o 8%, 14% de peroxiso de hydrogena. Este porcentaje se marcará en la jeringa. Desgaste de las bandejas en la boca 16% 30-60 minuto, 22% 30-45 minuto, 35% 5-15 minuto y 8% hasta 30 minuto y 14% hasta 5 minuto.

Después del tratamiento, retire la bandeja. Enjuague la boca con agua tibia y bandeja.

Cepillo de dientes. Repita el procedimiento según lo exija o se lo indique su profesional dental.

Espanol

Cepillar y pasar hilo dental los dientes. Tomar una jeringa en el kit. Retire la tapa e introduzca una punta dispensadora girandola firmemente en la jeringuilla.

Colocar una pequena gota de gel en cada compartimiento de la bandeja para los dientes sometidos a tratamiento.

Coloque la cubeta con el gel alrededor de los dientes.

Limpie cualquier exceso de gel en las encias con el dedo, un pañuelo de papel o un cepillo de dientes suave seco.

Dependiendo del nivel de manchas en los dientes y la salud de sus dientes, su dentista habria suministrado con concentraciones de gel de peroxiso de carbamida al 16%, 22%, 35% o 8%, 14% de peroxiso de hydrogena. Este porcentaje se marcará en la jeringa. Desgaste de las bandejas en la boca 16% 30-60 minuto, 22% 30-45 minuto, 35% 5-15 minuto y 8% hasta 30 minuto y 14% hasta 5 minuto.

Después del tratamiento, retire la bandeja. Enjuague la boca con agua tibia y bandeja.

Cepillo de dientes. Repita el procedimiento según lo exija o se lo indique su profesional dental.